

| N.p.k. | Zāļu nosaukums, forma un dozējums | Starptautiskais nosaukums | Informācija par iepakojumu | Reģistrācijas apliecības īpašnieks, valsts | Farmakoterapeitiskā grupa | ATĶ kods | Reģistrācijas numurs | Procedūras numurs | Reģistrācijas datums | Izplatīšanas nosacījumi |
|--------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------------|----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Jauna iepakojuma pievienošana

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|---|---------------------------------------|---------|---------|---------------|------------|--------------|
| 1 | Dettol Med 0,20 % cutaneous spray, solution Cutaneous spray, solution, 0,20 % Dettol Med 0,20 % uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums Uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums, 0,20% | Benzalkonii chloridum | 10 ml Polipropilēna pudele N1 100 ml ABPE pudele N1 | Reckitt Benckiser (Poland) S.A., Polija | antiseptisks, dezinfekcijas līdzeklis | D08AJ01 | 09-0455 | UK/H/1559/001 | 27.11.2009 | Bez receptes |
|---|---|-----------------------|--|---|---------------------------------------|---------|---------|---------------|------------|--------------|

Reģistrācijas apliecības īpašnieka nosaukuma maiņa

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------------|--------------------------|---------|---------|--|------------|-----|
| 2 | Fucicort Lipid 20 mg/1 mg/g cream Cream, 20 mg/1 mg/g Fucicort Lipid 20 mg/1 mg/g krēms Krēms, 20 mg/1 mg/g | Acidum fusidicum, Betamethasoni valeras | 15 g Alumīnija tūba N1 60 g Alumīnija tūba N1 5 g Alumīnija tūba N1 30 g Alumīnija tūba N1 | LEO Pharma A/S, Dānija | dermatoloģisks līdzeklis | D07CC01 | 10-0230 | | 21.05.2010 | Pr. |
|---|--|---|---|------------------------|--------------------------|---------|---------|--|------------|-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|-----------------------------|---|--|---|---------|---------|----------------------|------------|-----|
| <i>Kļūdas labojums aktīvās vielas nosaukumā</i> | | | | | | | | | | |
| 3 | Candegamma 2 mg tablets Tablets, 2 mg Candegamma 2 mg tabletes Tabletes, 2 mg | Candesartanum cilexetili | PVDH/PE/PVH/Al blisteris N7, N10, N14, N28, N30, N56, N98, N100, N300 | Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Vācija | angiotenzīna II receptoru antagonists | C09CA06 | 13-0005 | DE/H/3054/001 /DC | 21.01.2013 | Pr. |
| 4 | Candegamma 4 mg tablets Tablets, 4 mg Candegamma 4 mg tabletes Tabletes, 4 mg | Candesartanum cilexetili | PVDH/PE/PVH/Al blisteris N7, N10, N14, N28, N30, N56, N98, N100, N300 | Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Vācija | angiotenzīna II receptoru antagonists | C09CA06 | 13-0006 | DE/H/3054/002 /DC | 21.01.2013 | Pr. |
| 5 | Candegamma 8 mg tablets Tablets, 8 mg Candegamma 8 mg tabletes Tabletes, 8 mg | Candesartanum cilexetili | PVDH/PE/PVH/Al blisteris N7, N10, N14, N28, N30, N56, N98, N100, N300 | Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Vācija | angiotenzīna II receptoru antagonists | C09CA06 | 13-0007 | DE/H/3054/003 /DC | 21.01.2013 | Pr. |
| 6 | Candegamma 16 mg tablets Tablets, 16 mg Candegamma 16 mg tabletes Tabletes, 16 mg | Candesartanum cilexetili | PVDH/PE/PVH/Al blisteris N7, N10, N14, N28, N30, N56, N98, N100, N300 | Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Vācija | angiotenzīna II receptoru antagonists | C09CA06 | 13-0008 | DE/H/3054/004 /DC | 21.01.2013 | Pr. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|-----------------------------|---|--|---|---------|---------|----------------------|------------|-----|
| 7 | Candegamma 32 mg tablets Tablets, 32 mg Candegamma 32 mg tabletes Tabletes, 32 mg | Candesartanum cilexetili | PVDH/PE/PVH/Al blisteris N7, N10, N14, N28, N30, N56, N98, N100, N300 | Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Vācija | angiotenzīna II receptoru antagonists | C09CA06 | 13-0009 | DE/H/3054/005 /DC | 21.01.2013 | Pr. |

Humāno zāļu
novērtēšanas nodaļas
vadītāja vietniece
V. Guļevska